

Aus der Universitäts-Frauenklinik zu Breslau.
(Direktor: Professor Dr. L. Fraenkel.)

Über Röntgenabortus.

(Künstliche Einleitung der Frühgeburt
durch Röntgenstrahlen.)

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde
in der Medizin und Chirurgie
der Hohen Medizinischen Fakultät der Schlesischen
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau

vorgelegt von

HERBERT DORN

Arzt.

Breslau 1926.

Druck der Buchdruckerei der »Neustädter Zeitung« in Neustadt Oberschlesien.

Gedruckt mit Genehmigung der Hohen Medizinischen
Fakultät der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität
zu Breslau.

Berichterstatter: Professor Dr. Fraenkel.



Das neunzehnte Jahrhundert brachte der Medizin einen neuen Aufschwung. Es entstanden vor allem die physikalischen Heilmethoden, die schnell an Bedeutung gewannen. Im Jahre 1896 wurde die Röntgentherapie durch Freund in Wien begründet. Die ersten Versuche, die Röntgenstrahlen der Therapie nutzbar zu machen, mögen von Despeignes stammen, der kurz nach Röntgens großer Entdeckung die Bestrahlung eines Magen-Carcinoms vornahm. Im Jahre 1902 wurde die medizinische Welt durch eine verblüffende Nachricht des amerikanischen Arztes Senn überrascht, der von einer Einwirkung der Röntgenstrahlen auf innere Organe berichtete. Diese Mitteilung gewann an Wahrscheinlichkeit, als Albers Schönberg im Jahre 1903 beobachtete, daß öfter wiederholte Bestrahlungen der Hoden mit kleinen Röntgendosen bei Kaninchen und Meerschweinchen Sterilität zur Folge hatte. Bei diesen Experimenten sah man die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Geschlechtsdrüsen. Es erschienen weiter eine Reihe bedeutender Arbeiten, die sich sowohl mit dieser Frage beschäftigten, als auch damit, welchen Einfluß die Röntgenstrahlen auf die Schwangerschaft haben. Bevor ich nun auf das Hauptthema meiner Arbeit, den Röntgenabort beim Menschen, eingehe, sei es mir vorerst gestattet, kurz auf die diesbezüglichen grundlegenden Tierversuche einzugehen und ihre Ergebnisse hinsichtlich der Keimschädigung und der Fruchtschädigung durch Röntgenstrahlen zu betrachten.

Ähnliche Versuche wie die von Albers Schönberg wurden von Burckhard ausgeführt. Er bestrahlte die Ovarien von weißen Mäusen und zwar von einigen gleich nach der stattgefundenen Kohabitation, von anderen erst in der zweiten Schwangerschaftshälfte. Bei der Untersuchung der ersteren zeigte sich, daß die Mehrzahl der Weibchen nicht schwanger war, die wenigen übrigen, die gravid waren, zeigten Verlangsamung vor allem bei der Implantation und Segmentation des Eies. Bei der Untersuchung der zweiten Serie fand er, daß der Verlauf der Gravidität und die Geburt normal und rechtzeitig war. An den Ovarien selbst sah er keine Veränderungen. Dieser Befund stellte sich hernach als irrtümlich heraus, denn Halber-

städter bewies an bestrahlten Ovarien von Kaninchen, daß diese zur Atrophie gebracht worden waren. Specht untersuchte die bei den Halberstädter Versuchen gewonnenen Präparate mikroskopisch und fand sehr schwere Veränderungen nicht nur im Follikel-Apparat, sondern auch der interstitiellen Drüse. Auch andere hatten das gleiche Ergebnis bei Mäusen. Jedenfalls aber hat Burckhard als erster nachgewiesen, daß durch die Röntgenbestrahlung der Ovarien das Versuchstier sterilisiert wurde oder bei nachfolgender Gravidität sich alle Vorgänge bedeutend langsamer abwickelten.

Als die Arbeit Halberstädters bekannt gegeben war, unternahmen Fellner und Neumann in Wien weitere Versuche, wobei sie auch die Frage interessierte, ob bei kurzer Bestrahlung nur eine temporäre Sterilität herbeigeführt werden könnte. Sie bestrahlten die Ovarien von trächtigen Kaninchen, fanden gleichfalls eine Verlängerung der Tragzeit und eine »Degeneration sowohl des eireifenden, als auch des sekretorischen Parenchyms des Ovariums«, ließen aber die Frage noch offen, ob die eireifenden Funktionen sich wieder herstellen könnten. Außerdem war ein Rückgang der Gravidität zu beobachten, wenn die Röntgenstrahlen nach Einnistung des Eies einwirkten und zwar bei Bestrahlung der Ovarien mit Abdeckung des Uterus. Daraus zogen sie den Schluß, »daß die Tätigkeit des Ovariums, insbesondere die innersekretorische, zum mindesten bei Kaninchen nicht ohne Bedeutung für den Fortbestand der Gravidität in der ersten Hälfte derselben ist«. Damals stellten diese beiden Autoren auch eine Betrachtung darüber an, ob es möglich sein würde, durch diese Methode beim Menschen einen Röntgenabortus herbeiführen zu können. Ich lasse hier ihre eigenen Worte folgen: »Zur Einleitung des Abortus dürfte sich, falls sich die Versuche auf den Menschen übertragen lassen, die Methode nicht eignen, ganz abgesehen von den vielen Schwierigkeiten, welche die Anwendung so großer Dosen bietet, wie sie hier vielleicht notwendig wäre.«

Neben diesen unternahmen auch manche andere Autoren die Röntgenbestrahlung bei Tieren, von denen ich noch Lengsfellner, — auf dessen Versuch ich noch zurückkomme, — Manfred Fraenkel, Hippel, Pagenstecher, Cohn und andere nennen möchte.

Fellner, Neumann, Fraenkel und andere führten die Unterbrechung der Gravidität auf den direkten Einfluß der Röntgenstrahlen auf die Ovarien mit nachfolgender Atrophie derselben zurück, während Hippel, Pagenstecher, Cohn und andere den Standpunkt vertraten, daß sich infolge der Bestrah-

lung besondere Röntgenleukotoxine bildeten, die auf die Frucht schädlich einwirkten. Schließlich ergaben auch die Versuche, daß bei kurzer Bestrahlung temporäre, bei länger dauernder Bestrahlung dauernde Sterilität herbeigeführt werden kann. Zaretzky war der erste, der durch Experiment nachwies, daß die bestrahlten Eierstöcke nachher wieder ihre Funktion erlangen können.

Besonderes Interesse beanspruchten die Versuche Trillmichs, der zwanzig Meerschweinchen bestrahlen und danach decken ließ. Während die Kontrolltiere sämtlich konzipierten, wurden von den Versuchstieren innerhalb der ersten sieben Wochen nur vier schwanger, wovon aber nicht ein einziges lebende Junge zur Welt brachte. Bis zur einundzwanzigten Woche waren von den überlebenden elf Tieren nur noch vier steril, aber alle bis auf ein Muttertier warfen nur tote Junge. Andere Berichte, so der von M. Fraenkel, besagen, daß die Fortpflanzungsfähigkeit der bestrahlten Weibchen keineswegs gestört war, daß aber die Nachkommen an Größe bedeutend zurückblieben gegenüber denen der Kontrolltiere. Dies letztere Ergebnis wies auch Unterberger nach, der seine Versuche an Schmetterlingen (*Ocnieria dispar*) unternahm. Aus den Versuchen mußte man die Überzeugung von einer Schädigung des Keimes gewinnen, daß nämlich durch die Röntgenbestrahlung der Eierstöcke selbst die unreifen Eier derart beeinflusst werden können, daß, falls Befruchtung eintritt, nur minderwertige Schwangerschaftsprodukte entstehen können.

Lengfellner vollends hatte bereits im Jahre 1906 hochschwängere Meerschweinchen, die höchstens 2—3 Tage vor dem Gebären standen, den Röntgenstrahlen ausgesetzt. Er mußte die Feststellung machen, daß die Jungen danach entweder nur noch eine kleine Spur von Leben zeigten, oder überhaupt tot geboren wurden und zog daraus den berechtigten Schluß, daß die Röntgenstrahlen auf die lebende Frucht einen schädigenden Einfluß ausüben, sodaß je nach der Dauer der Bestrahlung entweder die Lebensfähigkeit stark vermindert ist oder die Früchte sogar tot zur Welt kommen. Lengfellner meinte damals, daß dies auf den Menschen übertragen von allergrößter Bedeutung sein müsse. Denn es sei nicht ausgeschlossen, daß eine wirksame Dosis, nur kurze Zeit aber wiederholt appliziert, den sicheren Tod der menschlichen Frucht bedingen könne, ohne daß dabei der Organismus der Mutter zu Schaden käme und man schließlich eine künstliche Einleitung der Frühgeburt durch Röntgenstrahlen bewerkstelligen könne.

Hertwig und seine Schule wiesen an Froscheiern und -Larven experimentell nach, daß durch die Röntgenbestrahlung Mißbildungen erzeugt werden können.

Ganz gegenläufig zu diesen Ergebnissen stehen die von Nürnberger gemachten Versuche an Mäusen. Er bestrahlte die männlichen Keimdrüsen und ließ von den bestrahlten Männchen normale Weibchen decken. Umgekehrt bestrahlte er die weiblichen Geschlechtsdrüsen und ließ die bestrahlten Weibchen von normalen Männchen decken. Deren Nachkommenchaft unterzog er einer Untersuchung. Sodann untersuchte er die Nachkommenchaft nach vorausgegangener Bestrahlung sowohl der väterlichen wie der mütterlichen Keimdrüsen und die von Tieren, die während der Gravidität bestrahlt worden waren. Schließlich stellte er noch vererbungsanalytische Studien an. Wie gesagt, waren die Ergebnisse seiner Versuche ganz verschieden von denen der anderen. Er sah nämlich nach der Röntgenbestrahlung der Mäuse nie eine Schädigung der Nachkommenchaft und leugnet, ebenso wie v. Seuffert, auch beim Menschen die Möglichkeit einer Keimschädigung. Es ist aber immerhin möglich, daß die Bestrahlung bei seinen Versuchen zu kurz und nicht stark genug war, um eine schädigende Wirkung erkennen zu lassen.

Neuerdings schreibt Schinz, daß er bei seinen Röntgenversuchen an Kaninchen — er bestrahlte, ebenso wie früher schon Lengfellner, den trächtigen Uterus — in der ersten Hälfte der Gravidität Rückgang der Trächtigkeit wahrgenommen habe, in der zweiten Hälfte Abortus oder Geburt von toten oder nur wenige Stunden überlebenden Tieren. Bei dem Rückgang der Schwangerschaft handelte es sich um eine symptomlose Resorption in utero, die um so sicherer eintrat, je früher die Bestrahlung erfolgte. Er vertritt den Standpunkt, daß der Abortus und Fruchtschwund durch direkt schädigende Wirkung auf die Embryonen zustande kommt und nicht auf dem Umwege über die Ovarialschädigungen, denn die Embryonen sind sogar röntgenempfindlicher als der generative Anteil der mütterlichen Keimdrüse, da nach den angestellten Versuchen sprungreife Follikel existierten. Eine Schwangerschaftsunterbrechung muß danach also möglich sein durch ausschließliche Röntgenbestrahlung des Uterus unter Schonung der Ovarien.

Was lehren nun diese Tierversuche? Können ihre Ergebnisse auch auf den Menschen übertragen werden?

Die Wirkung der Röntgenstrahlen zur Herbeiführung dauernder Sterilität beim Menschen ist bekannt. Was die Frage der

KeimSchädigung nach Eierstocksbestrahlung anbelangt, sei es — wie von einigen Autoren angenommen — z. B. infolge Bestrahlung zur Herbeiführung temporärer Sterilität oder, noch weitergegangen, infolge der sog. »Reizbestrahlungen« bei Fällen von Amenorrhoe, Sterilität und Unterfunktion der Eierstöcke, so gehen die Meinungen stark auseinander. Während Döderlein, Krönig, Hirsch und andere den Standpunkt vertraten, daß die Ovula durch die Bestrahlung geschädigt werden, — man fand nämlich ebenso wie beim Tier degenerative Veränderungen an den Primordialfollikeln und an den Follikeln überhaupt — und bei einer evtl. Befruchtung derartiger Ovula minderwertige Föten zur Welt kommen, widersprachen ihnen besonders v. Graff und Stern. Wenn immerhin die Frage der KeimSchädigung beim Menschen noch nicht als gelöstes Problem betrachtet werden kann, zeigen doch die Tierversuche, daß durch die Bestrahlung tatsächlich eine Schädigung der Nachkommenschaft hervorgerufen werden kann. Auch beim Menschen besteht die Gefahr der KeimSchädigung bei der Röntgenbestrahlung junger Frauen, sagt Driessen in neuester Zeit, weil seine Versuche an Kaninchen nämlich auch für die Annahme einer KeimSchädigung sprechen. Im Jahre 1921 auf dem Berliner Gynäkologen-Kongreß warnte Werner, der noch kurze Zeit vorher die Bestrahlung junger Frauen befürwortet hatte: »es besteht die dringende Gefahr, daß die Kinder solcher bestrahlten Frauen im Wachstum zurückbleiben und ihre Familien sogar dem Aussterben verfallen sind.« Seine klinischen Erfahrungen lehrten, daß solche Nachkommen Minderwertigkeit zeigten und daß bei in der Jugend bestrahlten Müttern die Neigung zu Fehlgeburten groß ist, was auch von anderen wie Miller, Zweifel, nach Radium- und Mesothorium-Bestrahlung beobachtet wurde. Unterberger schließt eine Arbeit mit den Worten: »wehe uns, wenn die späteren Geschlechter uns wegen unserer Polypragmalie in der Röntgentherapie verfluchen müssen!«

Im Folgenden möchte ich nun kurz einen von Heimann mitgeteilten Fall und die von Werner angestellten Untersuchungen anführen, bei denen man vielleicht von einer KeimSchädigung sprechen könnte, sofern überhaupt diese geringen Erfahrungen zu einem Schluß berechtigen.

Heimann berichtete über einen Fall, wo eine 43jährige Patientin wegen starker Blutungen außerhalb der Klinik bestrahlt worden war. Nach Angaben der Patientin wurde sie 23 mal innerhalb weniger Wochen bestrahlt, und zwar nur vom Bauch aus, jede Bestrahlung dauerte zirka zehn Minuten. Ob eine

Wirkung kurz nach der Bestrahlung eintrat, konnte die Patientin nicht mehr sagen. Jedenfalls traten bald danach wieder starke Blutungen auf und noch im selben Jahre wurde Patientin gravid. Im achten Monat der Schwangerschaft gebar die Frau ein in der Entwicklung dem Monat entsprechendes Kind. Im Alter von drei Jahren zeigte das Kind ein auffallend blaßes Aussehen. Mit einem Jahr fünf Monaten hatte es Laufen gelernt, doch war der Gang sehr taumlig. Es erschien nicht ausgeschlossen, daß durch die Bestrahlung diese Schädigung des Kindes herbeigeführt wurde, doch meint Heimann selbst, daß »der Fall vielleicht nicht ganz einschlägig ist«, da ja anscheinend nach der Bestrahlung keine Amenorrhoe als Zeichen einer Strahlenschädigung der Ovarien eintrat. Werner hatte mehrere Kinder im Alter von fünf Jahren nachuntersucht von Müttern, die bestrahlt worden waren. Bei drei Kindern fand er, daß sie an Leibesgewicht und Körpergröße zurückgeblieben waren.

Diese Anschauung von der Schädlichkeit der Bestrahlung junger Frauen, die wie gesagt auch noch heute teilweise vertreten wird, und den klinischen Erfahrungen hierüber stehen freilich noch größere Erfahrungen gegenüber, die das Gegenteil beweisen. Hierbei nimmt man nämlich als sicher an, daß die Entwicklung eines überhaupt irgendwie durch Strahlen geschädigten Eies vollkommen unterbunden wird und keine Möglichkeit besteht, daß ein mißgebildetes oder minderwertiges Kind zur Welt kommt.

So berichtet Zangemeister über einen Fall: Es handelte sich um eine 44jährige Frau, die im Herbst 1915 mit einem metritisch verdickten Uterus wegen Menorrhagien zur Behandlung kam. Es wurde Abrasio und Röntgenbestrahlungen vorgenommen. Patientin wurde in sechs Sitzungen bestrahlt. Dann entzog sie sich der weiteren Behandlung. Es blieb die Periode von März 1916 ab ganz aus. Als im Januar 1917 die Patientin wiederkam, war sie im fünften Monat gravid. Die Gravidität mußte eingetreten sein sechs Monate nach Beginn der Röntgen=Amenorrhoe. Die Schwangerschaft verlief, abgesehen von leichten hydropischen Erscheinungen, völlig ungestört. Wegen hochgradiger Narben an der Zervix, der bei früheren Entbindungen stets vorhandenen Wehenschwäche, wegen des engen Beckens und da drei Kinder bereits vorher tot geboren worden waren, wurde der zervikale transperitoneale Kaiserschnitt gemacht. Das Kind war 55 cm lang und 4130 Gramm schwer und vollkommen normal entwickelt.

Weitere derartige Fälle hören wir von Imbert, Holzknecht, Steiger und anderen. Es handelt sich dabei nicht allein

um die Angabe, daß die Kinder bei der Geburt völlig normal entwickelt waren, sondern die Beobachtungen hierüber erstrecken sich teilweise auf einige Jahre später. Pankow, der sich auch mit dieser Frage beschäftigte, meint ebenfalls, »daß nach Bestrahlungen vor der Gravidität selbst mit hohen Dosen bis zur Amenorrhoe mit der Entstehung mißgebildeter Früchte bei später auftretenden Schwangerschaften nicht gerechnet zu werden braucht«. Die Erfahrungen scheinen auch tatsächlich gegen die Annahme von der Keimschädigung durch Röntgenbestrahlungen zu sprechen.

Was nun die Fruchtschädigung anbelangt, so muß sie als sicher möglich bezeichnet werden. Denn abgesehen von den Tierversuchen, zeigen das auch die nun näher zu besprechenden klinischen Beobachtungen.

Wohl der erste in der Literatur bekannte Fall ist der von Manfred Fraenkel in Berlin beschriebene. Es handelte sich um eine junge Frau — sie war im dritten Monat gravid — im Anfangsstadium der Lungentuberkulose. Ihr Zustand und der sich zulehends verschlechternde Lungenbefund ließ eine frühzeitige Unterbrechung der Schwangerschaft indiziert erscheinen. Am 26. April 1907 wurde sie zum ersten Male begonnen und zwar mittels Röntgenstrahlen, da wegen des schlechten Zustandes der Patientin ein operativer Eingriff möglichst vermieden werden mußte. Bei einer Fokulentfernung von 25 cm mit Blende wurden 25 Sitzungen im ganzen, à fünf steigend bis zehn Minuten, vorgenommen, nach denen ein spontaner Abort unter wehenartigen Krämpfen und einer stärkeren Blutung eintrat, die nach spontanem Ausstoßen des ganzen Inhaltes listierte. Was nun die 25 Sitzungen anbelangt, so wurde eine abwechselnde Bestrahlung der Eierstöcke und der Schilddrüse vorgenommen. Bei ersteren unter Staniolabdeckung des ganzen Abdomen und Bleiglasblende von 60 cm Umfang. Die Staniolabdeckung sollte die sog. weichen Strahlen absorbieren und die Bleiglasblende sollte möglichst nur kleine Bezirke, die den Ovarien entsprachen, der Bestrahlung freigeben und den Uterus schonen. Die 25 Sitzungen waren so verteilt, daß jeden fünften Tag eine Pause von einem Tage eintrat, um die Bauchhaut zu schonen, jede fünfte Bestrahlung auf die Schilddrüse allein gerichtet war und zwar nur fünf Minuten, während die »Vollsitzungen«, wie sie Fraenkel nennt, bis zu zehn Minuten gesteigert wurden. Die Teilsitzungen wurden an denselben Tagen abgehalten, an denen bereits Bestrahlungen des Abdomen stattgefunden hatten. Die letzten vier Sitzungen wurden an zwei Tagen vorgenommen.

Fraenkel war der Überzeugung, daß es sich bei der Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Schilddrüse um einen besonderen Einfluß auf die Sexualorgane handelte, was ihm auch die Beobachtung an drei Fällen bewies.

Wir sehen, daß in diesem Falle eine Fruchtschädigung in Gestalt eines Abortus eintrat, und zwar nicht durch direkte Einwirkung der Röntgenstrahlen auf den schwangeren Uterus, sondern auf dem Wege über die Ovarien. Aus Fraenkels Bericht ersehen wir nicht, ob eine temporäre oder dauernde Sterilität der Frau danach eintrat, bezw. lesen wir nichts über eine spätere Gravidität. Jedenfalls bestände, vom Standpunkt der Keimtschädigung aus betrachtet, die Möglichkeit, daß zugleich mit dieser Fruchtschädigung auch eine Keimtschädigung resultiert, die, wie ich anfangs erwähnt habe, bei einer späteren Gravidität im Gefolge von temporärer Sterilität von einem minderwertigen Schwangerschaftsprodukt begleitet sein könnte. Hin und wieder wird aber auch die Forderung entstehen, neben dem einzuleitenden Abortus eine dauernde Sterilität der Frau herbeizuführen. Und damit wäre dann auch gleichzeitig eine etwaige Furcht vor Keimtschädigungen aufgehoben.

Verfolgen wir die Literatur weiter, so lesen wir, daß Gauß auf dem Röntgen-Kongreß 1909 berichtet, er habe es mehrfach fertig gebracht, Abortus durch Röntgenstrahlen zu bewerkstelligen. Der selbe Forscher sagt 1910, daß er abschließende Resultate über die künstliche Einleitung der Frühgeburt durch Röntgenstrahlen noch nicht mitteilen könne. Er war der Meinung, daß bei der Bestrahlung gravider Frauen im Beginn der Schwangerschaft Abort eintrete, in späterer Zeit kleine, aber nicht mißgebildete Früchte geboren würden und daß bei Bestrahlungen gegen Ende der Gravidität normale, ausgetragene Kinder zur Welt kämen.

Im Jahre 1910 teilt Trillmich einen Fall von mazeriertem Abort bei einer Patientin mit, welche vier Monate vorher in acht Sitzungen zu je fünf bis zehn Minuten, im ganzen 70 Minuten lang, bestrahlt worden war.

Ebenso gelang es Döderlein, einmal eine Fehlgeburt durch Bestrahlung zu provozieren.

Aus der Heidelberger Universitäts-Frauenklinik teilt Eymer im Jahre 1913 einen Fall mit, »bei dem vielleicht durch das Röntgenverfahren der Abortus eingeleitet wurde«. Es handelte sich um eine 46jährige Patientin, die wegen hochgradigen Blasenbeschwerden infolge Gravidität im dritten Monat die Klinik aufsuchte. Es bestand Harnverhaltung und eine schwere jauchige Zystitis. An vier aufeinander folgenden Tagen wurde die

Patientin röntgenisiert, im ganzen 28 Minuten lang. Bald setzten Wehen ein, die von Blutabgang gefolgt waren. Die Ausstoßung der Frucht allerdings konnte wegen eigentümlicher Lagerung des Uterus nicht erfolgen. Da die Zystitis immer bedrohlicher wurde, so schreibt Eymmer, und eine vaginale Entleerung des Uterus unter Erhaltung des Organs wegen der durch die Zystitis bestehenden Infektionsgefahr nicht ratsam war, so wurde zwei Tage nach der letzten Bestrahlung die abdominale Totalexstirpation vorgenommen. Der sogleich geöffnete Uterus enthielt eine Frucht von drei Monaten in ganz beginnender Mazeration. Im allgemeinen meinte Eymmer damals, eigene sich das Röntgenverfahren nicht im geringsten zur künstlichen Einleitung der Frühgeburt. »Die Herbeiführung des Abortes durch Röntgenstrahlen ist heute noch, selbst in den ersten Monaten der Gravidität, ein unsicheres Verfahren. Die alten Methoden sind sicherer und führen schneller zum Ziele.«

Mayer in Tübingen nahm ebenfalls die Röntgenisierung gravidier Frauen vor. So berichtet er von zehn Frauen, bei denen wegen Lungentuberkulose eine Unterbrechung der Gravidität und gleichzeitig Sterilisierung indiziert war. Einige Wochen vor der beabsichtigten Unterbrechung der Schwangerschaft wurden diese Frauen zum Zwecke der Sterilisierung röntgenbestrahlt und zwar frühestens in der elften Schwangerschaftswoche. Zweimal erfolgte Abortus. Mayer läßt jedoch die Frage offen, ob dieser propter oder post hoc erfolgt ist. Achtmal jedenfalls mußte die Gravidität operativ unterbrochen werden. An den beiden Föten sowohl wie an den Plazenten ließen sich weder makroskopisch noch mikroskopisch Veränderungen feststellen, die auf die Einwirkung der Röntgenstrahlen hätten zurückgeführt werden können. Die Technik der Bestrahlung war folgende: Es wurde ein Intensiv-Reformapparat der Veiffa-Werke verwendet von 190 000 Volt, 2 Milliampères, A. E. G.-Coolidge, 0,5 Zk. + 4 Al., bei einem Fokus-Hautabstand von 23 cm und einer Dauer von 42 Minuten, vier Bauchfelder, Tubus 6×8 cm, auf den Uterus zentriert, und zwei Rückenfelder mit anatomischem Tubus.

Von besonderem Wert für die Wissenschaft sind die von Archangelsky-Moskau berichteten sieben Fälle, zeigen sie uns doch auch auf Grund der mikroskopischen Untersuchungen, wie die Röntgenstrahlen unmittelbar schädigend auf die menschliche Frucht einwirken. Im folgenden möchte ich die Fälle kurz anführen.

1. Fall: Frau, 34 Jahre alt. 2 Partus. Kein Abort. Gynäkologisch gesund. Tbc. pulmonum. Menstruation seit 11

Tagen ausgeblieben. Von da ab Veränderung des normalen Allgemeinbefindens. Diagnose: Graviditas mens. $1\frac{1}{2}$. Die Schwangerschaftsunterbrechung wurde in vier Sitzungen vorgenommen und zwar mit Gundelach-Röhre, Härtegrad 10–12 W., Belastung 2 Milliampères, Filter 1 mm Aluminium. Die erste Sitzung erfolgte über 4 Abdominalfelder — 20 H., die zweite Sitzung über 2 Abdominalfelder — 10 H., die dritte über 2 Doralfelder — 10 H. und die vierte über 1 Abdominalfeld — 5 H., im ganzen also — 45 H.

Am fünften Tage nach dem Beginn der Bestrahlungen trat Blutung ein, der Wehen und reichliche Absonderung von Schleim vorhergingen. Nach einigen Tagen listierte die Blutung. Der Uterus war kontrahiert und von normaler Größe und Konsistenz. Nach einem Monat traten die Menfes wieder normal ein. Die nächste Menstruation trat nach drei Wochen ein, die dritten Menfes nach 25 Tagen. $1\frac{1}{2}$ Monate nach der Bestrahlung traten bei der Patientin oft Erregungszustände auf, die vorher nicht bestanden hatten.

2. Fall: Frau, keine Schwangerschaft. Tbc. pulmonum. Seit acht Tagen Regel ausgeblieben. Diagnose: Graviditas mens. 1. Die Röntgenbestrahlung erfolgte in sechs Sitzungen und zwar mit Müller- und Gundelach-Röhren, Härtegrad 10–12 W., Belastung 2 Milliampères, Filter 1 mm Aluminium. Die erste Sitzung per vaginam — 5 H. und über 1 Abdominalfeld — 5 H., die zweite Sitzung über 2 Abdominalfelder — 10 H., die dritte gleichfalls über 2 Abdominalfelder — 10 H., die vierte Sitzung über 1 Abdominalfeld — 5 H., die fünfte über 2 Doralfelder — 10 H., und die letzte Sitzung über 1 Abdominalfeld — 5 H. und per vaginam — 5 H., zusammen — 55 H.

Drei Tage nach der letzten Sitzung erfolgte Blutung und am nächsten Tage wurden nach heftigen Schmerzen einige größere Hautstücke und dann ein festes Gewebstück ausgestoßen. Nach Abgang dieses Stückes listierte die Blutung, am folgenden Tage hörte sie endgültig auf. Das Stück, das die Patientin allerdings nicht aufgehoben hatte, war nach ihrer Angabe 4–5 cm lang und ca. 3 cm breit und bestand aus kompaktem Gewebe. Die Untersuchung per vaginam nach Sistieren der Blutung ergab: Uterus gut kontrahiert, hart, von normaler Größe. Nach Ablauf von drei Wochen traten viertägige Menfes ein, ebenso verliefen die folgenden Menstruationen. Nach vier Monaten war die Frau wieder schwanger.

3. Fall: Frau, 3 Partus, 3 Aborte. Menstruation seit 19 Tagen ausgeblieben. Uterus apfelförmig groß. Tbc. pulmonum.

Die Röntgenbestrahlung erfolgte in 5 Sitzungen mit Müller-Röhre, Härtegrad 10–12 W., Belastung 2 Milliampères, Filter 1 mm Aluminium. Die erste Sitzung wurde vorgenommen per — vaginam — 6 H. und über 2 Abdominalfelder — 10 H., die zweite und dritte je über 2 Abdominalfelder à — 10 H., die vierte Sitzung über 2 Doralfelder — 10 H. und die fünfte über 1 Abdominalfeld — 5 H., im ganzen — 51 H.

Während der Sitzungen hatte Patientin teils schmerzlose Uteruskontraktionen, teils heftige Wehen. 15 Tage nach der letzten Sitzung erfolgte Blutung und schließlich wurde die Frucht ausgestoßen. Die Schmerzen listierten sofort. Danach gingen, noch Gewebsetzen ab. Das Ei war in toto ausgestoßen worden, es maß im Diameter $3\frac{1}{2}$ cm. Die nachfolgenden Fetzen bestanden aus Decidua. Die erste Menstruation trat 29 Tage nach dem Abort ein. Sie dauerte statt 3–4 Tage diesmal 5 Tage und war bedeutend stärker als früher. Das Allgemeinbefinden war gut, es bestand ein gewisser Erregungszustand. Die innere Untersuchung ergab: Uterus völlig kontrahiert, von normaler Größe und Konsistenz. Nach drei Monaten trat erneut Gravidität ein.

4. Fall: Frau, fünf Graviditäten. Sämtlich wegen Tbc. pulmonum mit artifiziellen Aborten beendet. Gynäkologisch gesund. Seit 14 Tagen Menstruation ausgeblieben. Uterus vergrößert (apfelgroß). Die Bestrahlung wurde in drei Sitzungen vorgenommen, mit Gundelach- und Müller-Röhre, Härtegrad 10–12 W., Belastung 2 Milliampères, Filter 1 mm Aluminium und zwar die erste Sitzung über 1 Abdominalfeld — 6 H., die zweite ebenfalls über 1 Abdominalfeld — 6 H. und die dritte per vaginam — 6 H., zusammen in drei Sitzungen — 18 H.

Nach der Röntgenisierung trat Blutung ein, die sich verstärkte, dann aber listierte. Die innere Untersuchung, die vor der Bestrahlung einen vergrößerten (apfelgroßen) Uterus ergeben hatte, zeigte jetzt den Uterus völlig kontrahiert. Nach Beendigung der Röntgenbehandlung traten die Menfes wieder pünktlich ein bei normaler Dauer und Stärke.

5. Fall: Frau, 26 Jahre alt. Menstruation seit 14 Tagen ausgeblieben. Tbc. pulmonum. Die Röntgenisierung erfolgte in sieben Sitzungen mit Radiologie-Röhre, Härtegrad 10–12 W., Belastung 2 Milliampères, Filter 1 mm Aluminium. Die erste Sitzung wurde vorgenommen über 1 Abdominalfeld — 5 H., die zweite über 2 Abdominalfelder — 15 H., die dritte auch über 2 Abdominalfelder — 10 H., die vierte Sitzung per vaginam — 5 H. und über 2 Doralfelder — 10 H., die fünfte

Sitzung über 1 Abdominalfeld — 6 H., die vorletzte gleichfalls über 1 Abdominalfeld — 6 H. und die letzte, siebente Sitzung, über 2 Abdominalfelder — 10 H., im ganzen — 67 H.

Während und nach den Sitzungen machten sich ziemliche Schmerzen im Unterleib und Kreuz bemerkbar. Zwei Tage nach der letzten Sitzung nahmen die Schmerzen einen wehenartigen Charakter an, es erfolgte Absonderung und schließlich ging die Frucht in toto ab. Danach trat eine stärkere Blutung ein, auch ging noch Eihaut ab. Einige Tage danach weder Schmerzen noch Absonderung. Genitalorgane normal.

6. Fall: Frau, 27 Jahre alt, zwei Partus, kein Abort. Tbc. pulmonum. Regel 12 Tage ausgeblieben. Uterus von der Größe eines mittleren Apfels. Die Röntgenbestrahlung bestand in drei Sitzungen, mit Radiologieröhre, Härtegrad 10 bis 12 W., Belastung 2 Milliampères, Filter 1 mm Aluminium und zwar erfolgte die erste Sitzung per vaginam — 5 H. und über 1 Abdominalfeld — 5 H., die zweite über 1 Abdominalfeld — 5 H. und die dritte über 2 Abdominalfelder — 12 H., zusammen — 27 H.

Nach den einzelnen Sitzungen trat Blutung auf, die am Tage nach der letzten Sitzung aufhörte. Der Uterus, der vor der Bestrahlung von der Größe eines mittleren Apfels war, war nunmehr kontrahiert und von normaler Größe und Konsistenz.

Auch der siebente von Archangelsky beschriebene Fall darf wohl in die Reihe der positiven Röntgenaborte eingerückt werden. Zwar wurde, wie wir sehen werden, am Tage nach Eintreten der Blutung operativ eingegriffen, der Grund hierfür lag aber an dem dringenden Wunsche der Patientin, die Klinik zu verlassen. Allerdings war man sich auch im Zweifel über die Wirksamkeit der Röntgenbestrahlung, da eine nur geringe blutig gefärbte Absonderung erfolgte, die bald stillstand. »Und, so sagt Archangelsky, auch dieser Fall hätte wohl zu spontanem Abort geführt, da die in dem Cavum uteri gefundenen Blutgerinself darauf hinweisen, daß es sich um einen abortus incompletus gehandelt hatte.«

7. Fall: Frau, 33 Jahre alt. Siebente Schwangerschaft, normale Geburten außer der fünften, eine Totgeburt. Kein Abortus. Seit 14 Tagen Regel ausgeblieben. Patientin litt an Hyperemesis gravidarum. Sie wurde in vier Sitzungen röntgenisiert, verwendet wurde Müller- und amerikanische Röhre, Härtegrad 10–12 W., Belastung 2 Milliampères, Filter 1 mm Aluminium. Die erste Sitzung fand statt per vaginam — 5 H. und über 1 Abdominalfeld — 6 H., die zweite über 4 Abdo-

minalfelder — 24 H., die dritte über 1 Abdominalfeld — 5 H. und über 2 Doralfelder — 10 H., die vierte Sitzung über 1 Abdominalfeld — 5 H., zusammen — 55 H.

Während der Sitzungen hatte die Patientin keine Schmerzen, wohl aber zum Schluß der Sitzungen ein leichtes Ziehen im Unterleib. Zwei Tage nach Beendigung der Röntgenisierung traten Spuren von Blut auf, die aber bald verschwanden. Da Patientin, wie oben bereits angeführt, die Klinik verlassen mußte, wurde ihr am Tage nach dem Auftreten der geringen Blutung die Frucht operativ entfernt. Im Cavum uteri Blutergüsse von altem dunklen Blutgerinself.

Was zeigen nun Archangelskys Fälle hinsichtlich der unmittelbar schädigenden Wirkung der Röntgenstrahlen auf die menschliche Frucht? Die Untersuchung der zwei in toto ausgestoßenen Embryonen ergab in verschiedenen Teilen Karyorrhaxis der Kerne der Fruchtzellen, besonders deutlich in dem sich entwickelnden Nervensystem. Außerdem waren die Veränderungen im Decidualgewebe charakteristisch für degenerativ-nekrotische Veränderungen und entzündliche Infiltrationen des Gewebes.

Schinz in Zürich hat auch mehrere Frauen, bei denen eine medizinische Indikation zur Schwangerschaftsunterbrechung mit gleichzeitiger Sterilisation bestand, durch Bestrahlung sterilisiert und den Röntgenaborte eingeleitet. Er meint dazu, daß er aber bereits heute von der Methode abgekommen sei, deshalb, weil es gelegentlich vorkommt, daß der Fötus beim Menschen nicht abstirbt und daß dann die Gefahr einer Fruchtschädigung besteht. Diese Gefahr schätzt er in der Tat auch sehr hoch ein, nachdem durch Little und Bagg nachgewiesen worden ist, daß Schädigungen, zum Beispiel Mißbildungen als Strahlenfolge erst in der zweiten Generation zum Vorschein zu kommen brauchen, also — in der modernen Vererbungsprache — rezessiv auftreten.

Aus allen diesen Fällen können wir mit mehr oder weniger großer Sicherheit schließen, daß es unter bestimmter Voraussetzung der anzuwendenden Technik zum Abort des Fötus kommen kann. Von Wichtigkeit erscheint dabei, besonders nach den Erfahrungen der Moskauer geburtshilflichen Universitätsklinik, der Umstand, daß die Bestrahlung in der frühesten Zeit der Gravidität vorgenommen wird, wenn schon auch die Literatur von später bestrahlten Fällen zu berichten weiß, bei denen hernach Abort eintrat. Es sind nach Archangelsky drei Faktoren, die die Wirkungsenergie der Röntgenstrahlen begünstigen:

1. Der embryonale Typus der Gewebe im Sinne der geringsten Differenzierungstendenz.

2. Das Jugendstadium der Zellen als Resultat der eben erfolgten Teilung der Mutterzellen.
3. Die Periode der energiegelichsten vor sich gehenden Zellteilung. Burkhards Tierversuche schon zeigten am deutlichsten die große Empfindlichkeit des Eies gegen die Röntgenstrahlen im Frühstadium der Schwangerschaft.

Was die Fernwirkung der Röntgenstrahlen anbetrifft, so war, so weit aus den betreffenden Fällen hervorgeht, keine schädliche Nebenwirkung zu beobachten. Auffallend sind vielleicht die in einigen der Fälle von Archangelsky beschriebenen Erregungszustände bei den Patientinnen, die nach der Röntgenisierung auftraten. Im allgemeinen erfolgten Meneses meist wieder rechtzeitig nach der Bestrahlung und waren normal. Zweimal konzipierten Frauen nach drei bzw. vier Monaten erneut.

Wie aber ist nun die Unterbrechung der Gravidität zu erklären?

Archangelsky, der die schönsten Erfolge auf diesem Gebiete bisher zu verzeichnen hat, gibt vier Möglichkeiten dafür an:

1. Die deletäre Einwirkung der Röntgenstrahlen unmittelbar auf den Fötus und das befruchtete Ei, als Folge Frucht= tot, Abort. Für diese Erklärung spricht die mikroskopische Untersuchung der Gewebe der Fötus in den beiden Fällen von Archangelsky und dem von Friedrich mitgeteilten Fall.
2. Die Röntgenstrahlen wirken auf den Uterus in toto resp. auf die Mucosa oder Muscularis ein. Für diese Erklärung sprechen die Kontraktionen des Uterus während oder gleich nach der Bestrahlung, die in einigen der beobachteten Fälle angegeben sind. Außerdem hat, wie uns die mikroskopische Untersuchung in zwei Fällen Archangelskys lehrt, die mucosa uteri durch die Bestrahlung Veränderungen erlitten, ebenso wie wir auch in der hiesigen Klinik mikroskopisch Schädigungen am Uterus nach Röntgenbestrahlung feststellen konnten, worauf ich noch zurückkommen werde.
3. Einfluß der Strahlen auf die Ovarien und als Folge Atrophie derselben und Unterbrechung der Gravidität. Diesen Standpunkt vertreten mehrere Autoren, was die Versuche an Tieren anbelangt. In M. Fraenkels Fall bestätigt sich diese Tatsache am deutlichsten auch beim Menschen.
4. Es bilden sich durch die Bestrahlung besondere Röntgen= leukotoxine, die auf die Frucht einen schädigenden Einfluß ausüben und sie zur Ausstoßung bringen. Anhänger

dieser Theorie sind nach ihren angestellten Tierversuchen Hippel, Pagenstecher, Cohn und andere, wie bereits am Anfange erwähnt.

Den Umstand, daß die Bestrahlung gerade für den jungen Fötus Schädigungen bedingt, sucht M. Fraenkel durch die Fruchtwasserverhältnisse zu erklären, was ich an dieser Stelle noch erwähnen möchte. Das Fruchtwasser, das sich ja erst im Laufe der Schwangerschaft bildet, absorbiert in einer nicht un= erheblichen Menge die Strahlen. »Den jungen Embryo muß also eine weit intensivere und größere Strahlenmenge treffen, als den drei bis vier Monate in seinem reichlichen Fruchtwasser geschützt schwimmenden.«

In der Literatur sind aber auch Fälle bekannt, wo durch die Röntgenbestrahlung nicht der gewünschte Abort herbeige= führt werden konnte. Es ist dies zum Teil vielleicht auf die damals noch nicht so gut ausgebildete Technik in der Röntgen= tiefentherapie zurückzuführen, wenn immerhin auch jetzt noch Mißerfolge zu buchen sind, für die man noch keine Erklärung gefunden hat.

Einen negativen Erfolg nach Röntgenbestrahlung zwecks Ein= leitung der Frühgeburt beobachtete P. Krause und Friedrich in Jena. Sie bestrahlten eine 31 Jahre alte Frau im vierten Schwangerschaftsmonat. Die Indikation gab schwere Tbc. pul= monum. Es wurde ein Kohlscher Apparat verwendet, mittel= weiche Röhren, Härtegrad 6—7 Walter, Entfernung 45 cm. Die Bestrahlung dauerte jedesmal 5 Minuten. Bestrahlt wurden nur Uterus und Ovarien, während das übrige Abdomen ab= gedeckt wurde. Einige Male erfolgte auch Bestrahlung der Schilddrüse. Nach 25 Bestrahlungen merkte die Patientin ein »Drängen nach unten«. Da nach der 33. Bestrahlung Hämoptoe auftrat, mußte die Gravidität auf operativem Wege unter= brochen werden. Der hierbei gewonnene Fötus wurde unter= sucht. Es fand sich eine schwere Schädigung an der Frucht, besonders an der Milz. Dieser Fall würde gleichzeitig beweisend dafür sein, daß wiederholte Röntgenbestrahlungen in der Gravi= dität, die aber nicht zum Abort führen, schwere Schädigungen der menschlichen Frucht bedingen können.

Auch Försterling=Hannover berichtet über einen Fall, wo er eine gravide Frau längere Zeit bestrahlte. Die Schwanger= schaft wurde aber durch die Röntgenisierung nicht unterbrochen.

Von Schmidt=Berlin hören wir, daß er bei einer 28 jährigen Patientin am Ende des zweiten Schwangerschaftsmonats wegen vorgeschrittener Lungenphthise im Jahre 1908 den Röntgenabort

einleiten wollte. Es bestand gleichzeitig die Absicht, dauernde Sterilität herbeizuführen. Die Anamnese ergab: 1902 erster Partus, Mädchen lungenkrank, 1903 Abort. 1904 Knabe, magen- und darmkrank, gestorben. 1904 künstlicher Abort, ebenso 1905. 1906 Partus eines Achtmonatskindes, lungen- und kehlkopf-leidend, Tbc. der Haut, gestorben. 1908 künstlicher Abort.

Die Einleitung des Abortes wurde zunächst, wie gesagt, mit Röntgenstrahlen versucht und zwar mit einer harten Röhre von 6–8 Walter. Die Entfernung des Fokus von der Haut betrug 17 cm. Filter wurde nicht verwendet, da die Strahlen ja von vornherein hart waren. Es wurde die linke und rechte Ovarialgegend je 6 Minuten bestrahlt, jede Partie erhielt knapp $\frac{1}{2}$ E. D. Drei Tage danach wurde jede Partie 12 Minuten lang bestrahlt, erhielt also knapp 1 E. D. Nach einer Pause von 14 Tagen erfolgte immer noch keine Reaktion. Danach wurde jede Partie 7,5 Minuten bestrahlt, erhielt also ungefähr $\frac{1}{2}$ E. D. 13 Tage später sah man zwar kein Erythem, aber deutlich follikulär angeordnete, punkt- bis linsengroße Blutungen. Dann kam es zu einer nässenden Dermatitis. Bei der Röhrenstellung war auch immer der Uterus sogar doppelt getroffen worden. Trotzdem blieb der erhoffte Abort aus. Er wurde dann durch Einlegen eines Laminariastiftes herbeigeführt. Eine Schädigung der Menstruation bestand nicht danach. An der Frucht selbst war makroskopisch nichts zu erkennen. Daß kein Erythem aufgetreten und im Verhältnis zur Reaktion die Latenzzeit sehr lang war, war bei dieser Röntgenbestrahlung merkwürdig. Schmidt selbst äußerte sich zu diesem Fall mit den Worten: »Jedenfalls zeigt dieser Fall, daß die Unterbrechung der Schwangerschaft nicht mit Sicherheit und der nötigen Schnelligkeit durch Röntgenbestrahlung herbeigeführt werden kann.«

Auch Reifferscheid in Bonn berichtet im Jahre 1910 von einer 37jährigen Patientin, bei der der künstliche Abort wegen Lungenphthise eingeleitet werden mußte und zwar vier Wochen nach der ersten und fünf Tage nach der letzten Bestrahlung, nachdem sie im ganzen sieben Mal ohne Erfolg röntgenisiert worden war und ungefähr $1\frac{1}{2}$ Erythem-Dosen erhalten hatte.

Auch Seitz-Erlangen gelang die Herbeiführung eines Abortes durch Röntgenstrahlen nicht. Davon spricht er unter anderem in der Münchener gynäkologischen Gesellschaft am 29. Januar 1911: »Ohne Erfolg war die Bestrahlung zur Herbeiführung eines künstlichen Abortes.«

Den gleichen Mißerfolg hatte Kelen in Budapest in einem Falle zu verzeichnen. Er versprach sich nichts von der Her-

vorrufung des künstlichen Abortes durch die Röntgenstrahlenbehandlung.

Mayer in Tübingen hatte, wie schon an anderer Stelle von mir erwähnt, zehn schwangere Frauen bestrahlt, bei denen wegen Phthise die Unterbrechung der Gravidität und gleichzeitig Sterilisierung angezeigt war. Während er nun die Frauen zum Zwecke der Sterilisierung röntgenisierte, trat bei zwei Patientinnen danach Abort ein, während bei den acht übrigen operativ die Frucht entfernt werden mußte.

Aber auch Archangelsky in Moskau, der auf dem Gebiete des Röntgenabortes sieben schöne Erfolge zu verzeichnen hat, mußte bei drei Patientinnen den Abort operativ einleiten, wenn ich von dem einen bereits besprochenen Fall absehe, bei dem der Fötus zwar operativ entfernt wurde, der Abort aber bei längerem Abwarten wohl sicher noch eingetreten wäre.

Fall 1: Frau, 26 Jahre alt, ein Partus, Menstruation 25 Tage ausgeblieben. Tbc. pulmonum. Diagnose: Graviditas mens. 2½. Die Röntgenbestrahlung erfolgte in drei Sitzungen und zwar mit Gundelach- und Müller-Röhren, Härtegrad 10–12 W., Belastung 2 Milliampères, Filter 1 mm Aluminium. Die erste Sitzung über 4 Abdominalfelder — 20 H., die zweite über 2 Doralfelder — 10 H. und die dritte über 4 Abdominalfelder — 15 H., zusammen — 45 H.

Nach der zweiten Sitzung traten wehenartige Schmerzen und reichliche Schleimabsonderung ein. Am dritten Tage nach der letzten Sitzung war der Uterus völlig kontrahiert, hart und von der Größe und Konstitution eines normalen, nicht graviden Uterus. Man nahm an, daß die Frucht durch die Bestrahlung schnell resorbiert worden sei. Als die Patientin darauf die Klinik verlassen mußte und sich nach einem Monat dort wieder vorstellte, klagte sie über dauerndes Übelsein, Erbrechen, starke Abmagerung und Erschöpfung. Der Status praesens war jetzt: Uterus entsprechend dem Anfang des vierten Schwangerschaftsmonates vergrößert. Darauf wurde der Fötus operativ entfernt.

Fall 2: Frau, 30 Jahre alt. Ein Partus, ein Abort. Regel seit 12 Tagen ausgeblieben. Uterus handgroß. Tbc. pulmonum. Die Röntgenbestrahlung erfolgte in 5 Sitzungen mit amerikanischer Röhre, Härtegrad 10–12 W., Belastung 2 Milliampères, Filter 1 mm Aluminium. Die erste Sitzung über 1 Abdominalfeld — 6 H., die zweite über 2 Abdominalfelder — 10 H., die dritte über 3 Abdominalfelder — 15 H., die vierte über 2 Doralfelder — 12 H. und die fünfte Sitzung per vaginam — 5 H., im ganzen — 48 H.

Nach der letzten Sitzung traten ziehende Schmerzen im Unterleib auf, sonst keine Senflationen. Drei Tage nach Beendigung der Bestrahlung wurde die Frucht operativ entfernt, da die Röntgenisierung ohne jeden Erfolg geblieben war. Die Länge der Frucht betrug 5 cm, was von einer Schwangerschaftsdauer von zwei Monaten spricht. Ein Monat nach Einleitung des Abortes trat die Menstruation wieder normal ein.

Fall 3: Frau, 33 Jahre alt. Ein Partus, ein Abortus. Regel seit 35 Tagen ausgeblieben. Uterus von der Größe einer großen Faust. Tbc. pulmonum. Die Bestrahlung wurde in fünf Sitzungen vorgenommen, mit Müller-Röhre, Härtegrad 10–12 W., Belastung 2 Milliampères, Filter 1 mm Aluminium und zwar die erste Sitzung per vaginam — 5 H. und über 1 Abdominalfeld — 5 H., die zweite über 2 Abdominalfelder — 10 H. und ebenso die dritte über 2 Abdominalfelder — 10 H., die vierte Sitzung über 1 Abdominalfeld — 5 H. und die letzte, fünfte, über 2 Dorsalfelder — 10 H., zusammen — 45 H.

Am Tage nach der ersten Sitzung merkte die Patientin periodische Wehen, die nach weiterer Strahlenbehandlung verschwanden. Nach der vierten Sitzung Absonderung einer geringen Menge von seröser Flüssigkeit. Da mit der applizierten Strahlendosis von 45 H. kein Erfolg zu erreichen war, zumal die Patientin nicht sterilisiert werden wollte, wurde der Uterus am Tage nach der letzten Bestrahlung ausgeräumt. Die Länge der Frucht betrug 4 cm.

In diesen letzten beiden Fällen folgte der operative Eingriff sehr schnell der vorläufig erfolglos gebliebenen Bestrahlung, vielleicht aber wäre doch noch bei längerem Abwarten ein Effekt eingetreten.

Im Folgenden will ich nun noch von drei an der hiesigen Universitäts-Frauenklinik beobachteten Fällen berichten. Im ersten Fall stammen allerdings einige Angaben aus dem Munde der Patientin und insofern erscheint es wichtig, sie mit Vorzicht aufzunehmen. Dennoch glaube ich, diesen Fall hier anführen zu dürfen: Frau H. G., von Beruf Näherin, 29 Jahre alt. Sie menstruiert seit ihrem 17. Lebensjahre regelmäßig, von 4–5 Tagen Dauer. Die letzte Periode war am 18. 3. 1923. Vor drei Jahren eine Schwangerschaft, die mit der normalen Geburt eines gesunden Kindes endigte. Es besteht Tbc. pulmonum. Sie sucht die Klinik auf, da sie nach neuerlich eingetretener Schwangerschaft an großer Mattigkeit, Schwindel und heftigen Kreuzschmerzen leidet.

Diagnose: Tbc. pulmonum. Graviditas: mens. 3.

Am 7. 6. 1923 wird die Röntgenbestrahlung zwecks Einleitung der Frühgeburt vorgenommen. Sie erfolgt in einer Sitzung. Verwendet wird ein Veiffa=Intensiv=Reformapparat, 190 kg=Volt, 2 Milliampères, Filter 0,8 Cu. + 1 Al., Entfernung 30 cm, Feldgröße 7×7,5 cm, Abdomen=Mitte, Dauer 95 Minuten.

Während der Sitzung bemerkte die Patientin ziehende Schmerzen im Unterleibe. Noch am gleichen Tage legte sie zu Fuß den Weg nach ihrer Wohnung zurück. Bereits unterwegs trat eine heftige Blutung auf, die nach Angaben der Patientin bedeutend stärker war als ihre Periodenblutungen. Schmerzen bestanden nicht. Wegen der Blutung, die aber inzwischen nachgelassen hatte, suchte sie am zweiten Tage nach der Sitzung einen Arzt außerhalb auf, der, nach ihrer Angabe, den Muttermund etwas eröffnet vorfand. Der behandelnde Arzt hat sich leider keine genauen Aufzeichnungen gemacht und kann auch aus der Erinnerung seinen Befund nicht mehr sicher angeben. Es wurde ein Laminariastift eingelegt. In der folgenden Nacht Wehen. Am dritten Tage nach der Röntgenisierung abratio uteri. Danach keine Schmerzen, ganz geringe Blutung. Das Allgemeinbefinden der Frau besserte sich wieder. Die nächste Menstruation erfolgte zum richtigen Termin und war normal. In sexueller Beziehung bestand keine Veränderung. Auch in diesem Fall traten, sofern die Angaben der Patientin zutreffen, nach der Röntgenbestrahlung zunächst starke Blutungen auf, in deren Verlauf es dann wahrscheinlich zur Eröffnung des Muttermundes kam. Besonders dieser letzte Umstand würde mit Sicherheit darauf hindeuten, daß der Abort im Gange war, und es wäre wahrscheinlich selbständig zur Ausstoßung der Frucht gekommen, wenn die Patientin nicht vorzeitig ärztliche Hilfe in Anspruch nahm, durch die die Frucht schließlich noch operativ entfernt wurde.

Fall 2: Frau L. K., 27 Jahre alt. Sie hatte einen normalen Partus im Februar 1922 durchgemacht, keinen Abortus. Die ersten Menfes setzten mit 15 Jahren ein, 3½=wöchentlich, von 5–6 Tagen Dauer, stark. Die letzte Regel war am 27. 8. 1924.

Status praefens: Vagina mittelweit, Uterus retroflektiert, etwas weich, etwas vergrößert, Adnexe frei.

Diagnose: Graviditas mens. 1–2. Tbc. pulmonum.

Die Röntgenbestrahlung zwecks künstlicher Einleitung der Frühgeburt erfolgte am 3. 10. 1924 in einer Sitzung. Verwendet wird ein Veiffa=Intensiv=Reformapparat, 190 kg=Volt, Milliam-

pères 2,0, Filter 0,8 Cu. + 1 Al., Entfernung 30 cm, Feldgröße 7×9 cm, Abdomen (Uterus), Dauer 100 Minuten.

Da kein Effekt zu buchen ist, wird die Frucht am 29. 10. 1924, also 26 Tage nach der Röntgenisierung, operativ entfernt. Der zerstückelte Fötus ist, vollständig wieder zusammengesetzt, ca. 4 cm lang.

Fall 3: M. Sch., Näherin, 19 Jahre alt. Kein Partus, kein Abort in der Anamnese. Die ersten Menfes traten mit 16 Jahren auf, 3–4 wöchentlich von 5–8 Tagen Dauer, unregelmäßig und stark. Die letzte Menstruation war am 28. Juli 1924.

Status praesens: Vagina mittelweit, livide verfärbt, Uterus vergrößert, entsprechend dem zweiten Monat einer Gravidität, Heghar positiv, Adnexe frei.

Diagnose: Graviditas mens. 2. Tbc. pulmonum.

Am 6. 10. 1924 wird die Bestrahlung wegen Aborteinleitung vorgenommen. Sie erfolgt in einer Sitzung, wieder mit einem Veiffa=Intensiv=Reformapparat, 190 Kilo=Volt, Milliampères 2,0, Filter 0,8 Cu. + 1 mm Al., Entfernung 30 cm, Feldgröße 5×8½ cm Abdomen, Dauer 90 Minuten.

Bestrahlung 1 HED., vormittags von 11 h bis 12³⁰ h. Nachmittags 4 h sieht man eine deutliche Rötung des Bestrahlungsfeldes. Am folgenden Tage, dem 7. 10., ist das Bestrahlungsfeld noch im Ganzen leicht braun=rötlich. Die Patientin verläßt die Klinik, wird aber am 22. 10. wieder aufgenommen. Da kein Erfolg zu beobachten ist, wird die Frucht mit Placenta und Eihäuten am 30. 10., also 24 Tage nach der Sitzung, digital und mit Abortlöffel entfernt. Der Fötus ist 9 cm lang.

Genau so wenig wie alle von den Autoren als positiv angeführten Fälle absolut bei scharfer Kritik als solche anzusehen sind, so scheint es auch nicht angängig, ohne weiteres die Fälle, bei denen kein Abortus eintrat, als definitiv erfolglos bestrahlt zu bezeichnen. Denn zur Beurteilung dieser Fälle, ob die Röntgenstrahlen irgend einen schädigenden Einfluß ausgeübt haben, ist natürlich hauptsächlich die mikroskopische Untersuchung von Placenta und Eihäuten, sowie des gewonnenen Fötus erforderlich. Und das dürfte in keinem Falle verläumt werden, wo Föten, die vorher den Röntgenstrahlen ausgesetzt waren, dann abortiert oder operativ entfernt wurden.

Im zweiten unserer Fälle war makroskopisch eine stellenweise schwielige Verdickung der Placenta und der Eihäute zu konstatieren. Mikroskopisch fanden sich nekrobiotische Veränderungen der Decidua und zwar eine stark degenerierte, nekro-

tische Decidua mit dichter kleinzelliger Infiltration. Die peripheren Schichten waren relativ gut erhalten, ebenso die Langhanszellen. Nicht ganz normal erschien das Syncytium, während die Chorionzotten von normalem Aussehen waren, das Zottenstroma war gut erhalten. Es handelt sich also anscheinend um eine Dicituitis (Endometritis deciduae).

Im dritten Falle bot die Placenta und die Eihäute makroskopisch weniger Veränderungen. Mikroskopisch fand sich ebenfalls eine stellenweise degenerierte Decidua, wobei die kleinzelligen Infiltrationen nicht so stark ausgesprochen waren, schwache oder gar keine Kernfärbung und Verlust der Zellgrenzen. Die Zotten wiesen keine Veränderungen auf.

Demnach sehen wir in diesen beiden Fällen die Hauptschädigungen durch die Röntgenstrahlen am Uterus. Selbstverständlich gehört dazu, wie ich oben erwähnte, auch die Untersuchung der Embryonen. Zum Studium der Veränderungen der Föten nach Bestrahlung zum Zwecke der Schwangerschaftsunterbrechung bedarf es sehr gründlicher und feiner Untersuchungsmethoden, die von anderer Seite in der Universitäts-Frauenklinik in Angriff genommen worden sind. Jedenfalls kann man auf Grund der mikroskopischen Untersuchung annehmen, daß in unseren Fällen 2 und 3 bei längerem Abwarten vielleicht doch noch ein spontaner Abort eingetreten wäre.

Zusammenfassend möchte ich nun sagen, daß nach den klinischen Erfahrungen die künstliche Einleitung der Frühgeburt durch Röntgenstrahlen möglich ist, wenn sie auch immerhin noch kein absolut sicheres Verfahren darstellt. Wie wir aus den bisher mitgeteilten Fällen von erfolgloser Bestrahlung gesehen haben, ist der Abortus nachträglich operativ herbeigeführt worden. Und das hat nicht nur seine Berechtigung, sondern ist, wie aus den jetzt zu erörternden Fällen hervorgeht, zwingende Notwendigkeit. Es sind nämlich nach Röntgenbestrahlungen Mißbildungen der Frucht beobachtet worden. Freilich braucht sich die Fruchtschädigung beim Menschen nicht immer in grober Mißbildung zu äußern, die Bestrahlung kann auch Frühgeburt oder Geburt eines schlecht entwickelten Kindes zur Folge haben. Wie Mayer schon sagte, darf eine Gravida genital nicht bestrahlt werden. Auch eine extragenitale Bestrahlung soll man sich bei bestehender Gravidität sehr überlegen wegen der möglichen und noch ziemlich unbekannten Fernwirkung auf die Frucht.

Die Literatur kennt Fälle, wo nach Röntgenisierung der Frucht die Geburt eines mißgebildeten Kindes erfolgte. So berichtet Aschenheim über einen Fall:

Bei einer Patientin wurden in den ersten Monaten der Schwangerschaft auf Grund der Diagnose »Myom« Röntgentiefenbestrahlungen mit großen Dosen vorgenommen. Das Kind wurde einen Monat zu früh geboren. Die Geburt wurde wegen des engen Beckens der Frau künstlich eingeleitet. Bei dem vierjährigen Kinde waren deutliche Bildungsstörungen vorhanden, wie Mikrocephalie, Mißbildungen der Augen und Störungen der geistigen Entwicklung.

Auch von Stettner ist ein Fall mitgeteilt: Eine gravide Patientin wurde zwecks Kastration bestrahlt. Sie litt an starken Myomblutungen. Es erfolgte Frühgeburt. Das Kind war 1550 g schwer und 40 cm lang. Im Alter von 2¼ Jahren zeigte es Bildungsstörungen: Mikrophthalmie und erhebliche Intelligenzdefekte.

Werner berichtet von einem Kinde, dessen Mutter während der Schwangerschaft bestrahlt worden war und das vier Wochen zu spät kam, trotzdem aber äußerst schlecht entwickelt war. Das Gewicht betrug 1950 g, die Länge 45 cm. Die Hautfarbe war fahl-gelblich, die Haut selbst schlaff und faltig, reichlich von Lanugohärchen bedeckt.

Daß die Röntgenstrahlen auf den Fötus, auch wenn es nicht zum Abort kommt, schädigend einwirken, beweisen gleichfalls die Untersuchungen Friedrichs und Abrikossows an operativ entfernten Föten, die vorher der Bestrahlung ausgesetzt worden waren. So fand Friedrich in seinem Fall schwere Schädigungen des Fötus, besonders an der Milz, während in den übrigen blutbildenden Organen weniger deutliche Schädigungen nachweisbar waren. Es handelte sich um Schwund der lymphozytären Elemente in Follikeln und Pulpa. Die Zellkerne waren pyknotisch und es machte sich ein gehäuftes Auftreten von Pigment bemerkbar. In anderen lymphatischen Organen sah man ähnliche Veränderungen. In den Blutgefäßen waren die weißen Blutzellen fast verschwunden.

Abrikossow, der die beiden Fälle Archangelskys untersuchte, wo ja die Frucht in toto ausgestoßen worden war, fand, wie schon erwähnt, in verschiedenen Teilen Karyorrhesis der Kerne der Fruchtzellen, besonders deutlich in dem sich bildenden Nervensystem und Veränderungen im Decidualgewebe, wie wir auch in den beiden Fällen der hiesigen Klinik eine Deciduitis diagnostizieren konnten.

Auf Grund dieser Tatsachen, in Erkenntnis der großen Gefahr der Fruchtschädigungen, ließ Gauß schon vor Jahren die Patientinnen sich verpflichten, bei etwaiger Erfolglosigkeit

des Röntgenverfahrens den Abort nach der alten Methode einleiten zu lassen, um sich vor Schadenerfatzansprüchen zu sichern. Auch nach seiner Meinung besteht die Möglichkeit, daß hernach ein lebensfähiges, aber auf irgend welche Weise röntgengeschädigtes Kind geboren werden könne.

Im Widerspruch zu diesen klinischen Erfahrungen stehen freilich auch Angaben einiger Autoren, die nach Röntgenbestrahlung gravider Frauen keine Schädigungen beobachten konnten. Keineswegs aber wird man diese Fälle ins Feld führen können gegen die Gültigkeit der Annahme von der Fruchtschädigung.

Bereits im Jahre 1906 hebt Pinard hervor, daß er trotz 30—40 Minuten langer Bestrahlung nie Schädigungen beobachtet habe. So hat er 27 Frauen röntgenbestrahlt während der Schwangerschaft und in jedem Stadium, »sans aucun incident pour la mère ni pour l'enfant«. Er stellte fest, daß das Gewicht der Kinder von Frauen, die während der Gravidität bestrahlt worden waren, in nichts nachstand dem Gewicht der Kinder von nicht bestrahlten Müttern.

Wenn man nun all diese Fälle, wo eine Fruchtschädigung durch die Bestrahlung zustande kam, in Betracht zieht, so wird man die große Gefahr, die mit der Bestrahlung gravider Frauen verknüpft ist, keineswegs negieren können. Und selbst im Hinblick auf die Fälle in der Literatur, wo Mütter, die während der Gravidität bestrahlt wurden, doch mit einem gefunden, normalen Kinde niederkamen, und die Untersuchungen Köhlers und Mayers, die makroskopisch und mikroskopisch keine Schädigung nach Einwirkung der Röntgenstrahlen am Fötus sahen, erscheint die Furcht vor Fruchtschädigungen nicht unberechtigt. Und somit wäre als unbedingter Grundsatz aufzustellen:

Ein bestrahlter und nicht abortierter Fötus muß operativ entfernt werden.

Daß die Röntgenstrahlen unmittelbar auf den Fötus und das befruchtete Ei einwirken, davon habe ich bereits gesprochen. Diese Tatsache läßt es erklärlich erscheinen, daß ein mit entsprechender Dosis bestrahlter Embryo nun mit Mißbildungen oder schlecht entwickelt zur Welt kommt. Daß auch infolge Bestrahlung während der Gravidität Frühgeburt erfolgen kann, möchte M. Fraenkel darauf zurückführen, daß durch die Röntgenisierung der mütterliche Organismus geschwächt und indirekt der Fötus in seiner Ernährung und Entwicklung beeinträchtigt wird.

»Auch die Röntgenbestrahlung, so sagt Fraenkel, ist ein Eingriff, und zwar kein ganz unbedeutender, in die Funktion

der lebenden Substanz.« Die Röntgenstrahlen, die die Diagnose und Therapie der Krankheiten in neue Bahnen gelenkt haben, sind aber noch lange nicht voll und ganz in ihrer biologischen Wirkung erkannt. Die Grundlage der Strahlentherapie ist immer noch das Experiment. Auf der einen Seite die schönsten Erfolge, dringen die Strahlen auf der anderen Seite als gefahrbringendes Geheimnis in die Körpersubstanz ein. An den jetzt immerhin besseren Erfolgen hat einen guten Anteil die Verbesserung der Röntgentechnik. Wir sind heute imstande, bei gleich langen Bestrahlungen wesentlich größere Dosen und auch durchdringungsfähigere Strahlen in den Körper zu senden. Damit allerdings wächst auch die Gefahr. Wir haben im Laufe der Jahre gesehen, wie die Röntgenstrahlen, deren Wirkung man früher zur künstlichen Einleitung der Frühgeburt absolut in Frage stellte, immer mehr zur Entfaltung ihrer geheimen Kräfte gelangt sind, wie sie nach den vorliegenden Fällen heutzutage immer besser dazu geeignet werden, den Abort beim Menschen zu provozieren. Mit der Zeit dürfte sich auch dieses Verfahren noch vollkommener und sicherer gestalten, sodaß es vor dem operativen Eingriff, der der Bestrahlung gegenüber an völliger Asepsis zu wünschen übrig läßt, allmählich an Vorzug gewinnt.

✱

Zum Schluß sei es mir vergönnt, Herrn Oberarzt, Privatdozent Dr. Fr. Chr. Geller für die Überlassung des Themas, die gegebenen Anleitungen, sowie die Durchsicht dieser Arbeit meinen verbindlichsten Dank abzustatten.



Literaturangabe.

1. Archangelsky: Zur Frage von der Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Frühstadium der Gravidität. Archiv für Gynäkologie 1923.
2. Driessen: Keimschädigung durch Röntgenstrahlen. Strahlentherapie Band 16,5.
3. Eymers: Archiv und Atlas der normalen und pathologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern: Die Röntgenstrahlen in Gynäkologie und Geburtshilfe.
4. Edelberg: Ein Ovarialbefund nach Röntgenbehandlung. Zentralblatt für Gynäkologie. 1914, Nr. 24.
5. Edelberg: Röntgenstrahlen und Schwangerschaft. Zentralblatt für Gynäkologie. 1914, Nr. 43.
6. Fellner & Neumann: Über Röntgenbestrahlung der Ovarien in der Schwangerschaft. Zentralblatt für Gynäkologie. 1906, Nr. 22.
7. Fraenkel, Manfred: Ein Abort durch Röntgenstrahlen. Zentralblatt für Gynäkologie. 1907, Nr. 31.
8. Fraenkel, Manfred: Die Bedeutung der zellfunktionssteigernden Strahlenwirkung in Bezug auf Zeitsterilisation und zur Frage der Schädigung von Nachkommenchaft durch Röntgenstrahlen. Strahlentherapie. Band 16, Nr. 5.
9. Friedrich: Verhandlungen der Deutschen Röntgengesellschaft. Band IV, p. 135.
10. Försterling: Verhandlungen der deutschen Röntgengesellschaft. Band IV, p. 136.
11. Gauß: Die temporäre Sterilisation tuberkulöser Frauen durch Röntgenstrahlen. Zentralblatt für Gynäkologie. 1911, Nr. 28.
12. von Hippel und Pagenstecher: Über den Einfluß des Cholins und der Röntgenstrahlen auf den Ablauf der Gravidität. Münchener Med. Wochenschrift. 1907, Nr. 10.
13. Hertwig: Das Radiumexperiment in der Biologie. Strahlentherapie. 1920, 11.
14. Heimann: Eierstockfunktion und Bestrahlung. Strahlentherapie. 1920, 11.
15. Holzknecht: Geburtshilffich-gynäkologische Gesellschaft in Wien. Zentralblatt für Gynäkologie. 1921, Nr. 41.

16. Halberstädter: Die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf Ovarien. Berliner klin. Wochenschrift. 1905, Nr. 3.
17. Köhler: Geburtshilflich-gynäkologische Gesellschaft in Wien. Zentralblatt für Gynäkologie. 1914, Nr. 24.
18. Kelen: Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Zentralblatt für Gynäkologie. 1911, Nr. 40.
19. Koblack: Myomatöser gravider Uterus nach Röntgenbehandlung. Berliner klin. Wochenschrift. 1915, Nr. 1.
20. Lengfellner: Über Versuche von Einwirkung der Röntgenstrahlen auf Ovarien und den schwangeren Uterus von Meerschweinchen. Münchener Med. Wochenschrift. 1906, Nr. 44.
21. Mayer: Über die Beeinflussung der Frühschwangerschaft durch Röntgenstrahlen. Zentralblatt für Gynäkologie. 1921, Nr. 36.
22. Mayer: Röntgentherapie in der Gynäkologie. Strahlentherapie. 1923, 14.
23. Nürnberger: Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf den Uterus der weißen Maus. Zugleich ein Beitrag zur Histologie der Strahlenwirkung überhaupt. Strahlentherapie. 1920, 10.
24. Pankow: Sind bei Schwangerschaften nach Röntgentiefentherapie mit großen Dosen Mißbildungen der Früchte zu erwarten? Strahlentherapie. 1920, 10.
25. Pinard: sur les conditions légales de l'emploi médical des rayons Röntgen. Bulletin de l'Académie de Médecine 1906 séance du 16 janvier 1906.
26. Reifferscheid: Histologische Studien über die Beeinflussung menschlicher und tierischer Ovarien durch Röntgenstrahlen. Zentralblatt für Gynäkologie. 1910, Nr. 18.
27. Specht: Mikroskopische Befunde von röntgenisierten Kaninchenovarien. Archiv für Gynäkologie. 1906.
28. Schinz: Der Röntgenabort. Zugleich ein Beitrag zum spontanen Fruchtschwund, zur Eiüberwanderung und zur Frage der innersekretorischen Gewebelemente der Keimdrüsen. Strahlentherapie. 1923, 15.
29. Schinz: Biologische Grundlagen der Strahlentherapie. Sonderabdruck aus »Verhandlungen der Deutschen Röntgengesellschaft«. Band 15, 1924.
30. Schumann: Über einen Fall von Schwangerschaft nach Röntgenkastration mit dem Ergebnis eines normal entwickelten Kindes. Strahlentherapie. 1919, 9.
31. Steiger: Schwangerschaft und Geburt nach Röntgenbestrahlung des myomatösen Uterus. Zentralblatt für Gynäkologie. 1922, Nr. 25.
32. Schmidt: Zur Frage der Schwangerschaftsunterbrechung durch Röntgenstrahlen. Deutsche Med. Wochenschrift. 1909, Nr. 24.
33. Seitz: Diskussion zu Döderlein »über Röntgentherapie«. Zentralblatt für Gynäkologie. 1911, Nr. 21.

34. Schweitzer: Über die Komplikation der Schwangerschaft mit Gebärmutterkrebs. Zentralblatt für Gynäkologie. 1923, Nr. 17.
35. Trillmich: Experimenteller Beitrag zur Einleitung des künstlichen Abortes und zur Sterilisation durch Röntgenstrahlen. Zentralblatt für Gynäkologie. 1912, Nr. 43.
36. Unterberger: Experimentelle RöntgenSchädigung der Ovarien und der Einfluß auf die Nachkommenschaft. Zentralblatt für Gynäkologie. 1923, Nr. 1.
37. Unterberger: Experimentelle RöntgenSchädigung der Ovarien und ihr Einfluß auf die Nachkommenschaft. Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie. 1922.
38. Werner: Beitrag zur Kenntnis des Verhaltens der Eierstockfunktion nach der Röntgentiefentherapie. Archiv für Gynäkologie. 1919.
39. Wetterer: Handbuch der Röntgentherapie. Band 1, 1913/1914.
40. Zaretzky: Experimentelle X-Atrophie der Eierstöcke und ihre Folgen. Zentralblatt für Gynäkologie. 1909, Nr. 27.
41. Zaretzky: Ein Versuch der therapeutischen Röntgenisation der Eierstöcke. Zentralblatt für Gynäkologie. 1910, Nr. 4.
42. Zangemeister: Schwangerschaft bei Röntgenamenorrhoe. Münchener Med. Wochenschrift. 1917, Nr. 36.
43. Zweifel: Die Strahlenbehandlung der Myome und Metropathien des Uterus. Strahlentherapie. 1921, 12.
44. Zweifel: Erfahrungen mit der Strahlentherapie des Uteruscollumcarcinoms. Strahlentherapie. 1923, 15.

Lebenslauf.

Am 8. März 1900 wurde ich als Sohn des jetzt in Glatz wohnenden Zigarrenfabrikanten Richard Dorn und seiner Ehefrau Wanda, geb. Riedel, in Wanfen i. Schles. geboren. In meiner Geburtsstadt besuchte ich die Volksschule und in Strehlen i. Schl. das humanistische Gymnasium. Im Jahre 1918 wurde ich zum Kriegsdienst einberufen. Nach der Entlassung aus dem Heere besuchte ich am humanistischen Gymnasium in Glatz einen Sonderkurs für Kriegsteilnehmer und bestand Ostern 1920 die Reifeprüfung. Ich widmete mich zunächst in Breslau während drei Semestern dem Studium der Medizin, sodann in Greifswald während zwei Semestern, wo ich auch die ärztliche Vorprüfung ablegte, in München gleichfalls während zwei Semestern und schließlich wieder in Breslau während drei Semestern, wo ich im Juni 1925 das ärztliche Staatsexamen bestand. Am 1. Juli 1925 trat ich in das vorgeschriebene praktische Jahr ein und war während dieser Zeit am Knappschaftslazarett in Neurode i. Eulengebirge und am Städt. Krankenhause in Schneidemühl tätig. Ich bin evangelischer Konfession und preußischer Staatsangehörigkeit.

